


Linee guida RCP/DAE

Linee guida ERC (European Resuscitation Council) 2015

RIFERIMENTO RCP NEGLI ADULTI

 <p>1</p>	<p>VALUTARE LA SICUREZZA AMBIENTALE E VERIFICARE LA COSCIENZA DELLA VITTIMA</p> <ul style="list-style-type: none">• Scuotere delicatamente• Urlare per chiedere aiuto• Allertare il 118 e chiedere un DAE.
 <p>Aprire le vie aeree Guarda + Ascolta + Senti per non più di 10 secondi</p> <p>Verificare assenza di respiro o presenza di rantoli.</p> <p>2</p>	<p>VERIFICARE LA RESPIRAZIONE</p> <ul style="list-style-type: none">• Se non respira normalmente, richiamare il 118• Chiedere a qualcuno di procurare un DAE <p>Nota: Il personale sanitario può verificare la presenza di battito, ma per non oltre 10 secondi</p>
 <p>Profondità: da 5 a 6 cm Velocità: Almeno 100-120/min</p> <p>3</p>	<p>SOMMINISTRARE 30 COMPRESSIONI TORACICHE</p> <ul style="list-style-type: none">• Torace scoperto• Appoggiare la parte terminale del palmo della mano al centro del torace della vittima. Appoggiare la parte terminale del palmo dell'altra mano sopra la prima mano.• Rilasciare completamente• Ridurre al minimo le interruzioni
 <p>4</p>	<p>EFFETTUARE RESPIRAZIONE ARTIFICIALE</p> <ul style="list-style-type: none">• Effettuare 2 insufflazioni• Alternare 30 compressioni toraciche a 2 insufflazioni <p>Nota: Gli operatori non addestrati devono continuare a effettuare le compressioni manuali</p>

RIFERIMENTO DAE

  <p>5</p> <p>Attivare il dispositivo DAE appena possibile—OPPURE Eseguire RCP fino all'arrivo di un DAE</p>	<p>ACCENDERE IL DISPOSITIVO DAE</p> <ul style="list-style-type: none">• Applicare gli elettrodi sul torace scoperto• Il DAE inizia l'analisi del ritmo• Garantire la sicurezza della scena• Erogare lo shock• Riprendere immediatamente la RCP per 2 minuti
--	--